

## PROYECTO DE ROTULO Y PROSPECTO

### **CEDRIMUC®** **ACETILCISTEINA 200 mg** **Polvo granulado**

**Industria Argentina**

**Venta Libre**

**LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE UTILIZAR Cedrimuc®**, conserve este prospecto, contiene información que puede ser útil volver a leer.

#### **¿Qué contiene Cedrimuc®?**

Cada sobre monodosis de polvo granulado contiene:

Principios activos: acetilcisteína 200 miligramos.

Principios inactivos: carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, ácido cítrico anhidro, dióxido de silicio coloidal, sucralosa, sabor naranja en polvo, colorante FD&C amarillo N° 6.

**ACCIÓN:** Cedrimuc® pertenece a un grupo de medicamentos llamados mucolíticos, es decir que rompe químicamente el moco haciéndolo más líquido para que pueda ser eliminado.

#### **¿Para qué se usa Cedrimuc®?**

Cedrimuc® fluidifica el moco adherido, despegándolo y facilitando su expulsión.

Este medicamento se utiliza en los procesos catarrales y gripales para reducir la viscosidad de los mocos y flemas, facilitando su expulsión.

#### **¿Qué personas no pueden utilizar Cedrimuc®?:**

**NO USE** este medicamento:

- si es alérgico a acetilcisteína o a cualquiera de sus componentes.
- si padece úlcera aguda de estómago o duodeno .
- en menores de 12 años.
- si está embarazada o dándole el pecho a su bebé.

#### **¿Qué cuidados debo tener antes de tomar Cedrimuc®?**

Consulte a su médico antes de iniciar el tratamiento con **Cedrimuc®** si:

- usted toma medicamentos para la tos (antitusivos) o que disminuyen las secreciones bronquiales (como los antihistamínicos y los anticolinérgicos), ya que pueden provocar una acumulación del moco fluidificado.
- si padece problemas respiratorios crónicos como asma o problemas respiratorios de gravedad.
- usted toma algún medicamento que contenga minerales como el hierro o calcio, o algún medicamento con antibióticos (como la ampicilina, los macrólidos, las cefalosporinas y la anfotericina B). En estos casos, debe separar la toma de los mismos de la toma de **Cedrimuc®** al menos 2 horas.

- es posible que encuentre un olor intenso (olor azufrado) que es propio del principio activo del medicamento. No indica que **Cedrimuc**® esté en malas condiciones.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dándole pecho a su bebé, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

### **¿Cómo se usa este medicamento?**

**Cedrimuc**® es de administración oral.

*Modo de uso:* colocar todo el contenido de un sobre en medio vaso de agua. Agite hasta que se disuelva por completo el granulado. Administrar luego de las comidas.

*La dosis usual es:* adultos y niños mayores de 12 años: 1 sobre monodosis de 200 miligramos tres veces por día. No superar la dosis de 3 sobres al día.

La duración del tratamiento es en general entre 5 a 7 días.

Si usted olvidó tomar **Cedrimuc**® no tome luego una dosis doble para compensar las olvidadas.

El consumo de alimentos y bebidas no afecta su eficacia. **Cedrimuc**® se puede tomar con o sin comida.

### **¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?**

Como todos los medicamentos, la acetilcisteína puede tener efectos adversos. Ocasionalmente pueden aparecer molestias digestivas como ardor estomacal, náuseas, vómitos, diarrea. Raramente pueden observarse somnolencia, dolor de cabeza, erupción cutánea y fiebre.

Acetilcisteína puede producir somnolencia. Si le produce somnolencia, no conduzca ni use maquinaria peligrosa.

Si usted observa éstos o cualquier otro efecto no descrito en este prospecto, consulte a su médico.

Si usted observa que los síntomas empeoran o si persisten después de 5 días de tratamiento, consulte a su médico.

### **¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé más cantidad de la necesaria?**

Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247
- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 ó (011) 4658-7777
- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.

Para otras consultas: Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix  
0800-333-3532.

### **¿Cómo se debe guardar este medicamento?**

#### **Modo de conservación:**

Conservar a temperatura ambiente, hasta 25°C.

### **PRESENTACIÓN**

1 sobre monodosis

Envase conteniendo 10 sobres monodosis.

Envase conteniendo 30 sobres monodosis.

**¿Dudas? ¿Consultas?**  
**0800-333-3532 (ELEA PHOENIX)**

**ANMAT responde: 0800-333-1234**

Verifique la fecha de vencimiento antes de consumir cualquier medicamento.

**MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud  
Certificado N° 59.104

Director Técnico: Alfredo Boccardo - Farmacéutico

Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención Telefónica  
0800-333-3532. [www.elea.com](http://www.elea.com)

Fecha de última revisión: Noviembre/2019